

Carlos J. Lavernia, M.D.
Teléfono: (305) 484-9727
Fax: (786) 667-8723

Estimado Paciente:

Una pequeña nota para dejarle saber que dos semanas antes de su cirugía usted debe de parar de tomar los siguientes medicamentos: Aspirina o cualquier anti-inflamatorio no-esteroidal como Advil, Arthrotec, Diclofenac, Meloxicam, Aleve, Motrin, Naprosyn, Feldene, Ibuprofen, Voltaren o productos naturales como Colageno, Cayenne, Dong Quai, Echinacea, Fish Oil, Garlic, Ginger, Ginkgo Biloba, Ginseng, Kava Kava, Licorice Root, Ma Huang, Melatonin, Red Clover, St. John's Wort, CoQ10, Glucosamina y Vitamina E. Cualquier inyección que incluya Mounjaro, Wegovy, Ozempic, Zepbound, Trulicity también deberá suspenderse dos semanas antes de la cirugía.

Además, si usted está tomando Metotrexate, Simponi, Xeljanz, Enbrel, Humira, Brillinta, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Plavix o Cumadina debe hablar con su medico lo antes posible, ya que el/ella necesita discontinuarle este medicamento antes de su cirugía. Esto es importante para tratar de evitar o minimizar la posibilidad de sangrado abundante o infección durante su cirugía.

Si tiene alguna pregunta a lo referente, por favor llame a nuestra oficina al 305- 484-9727.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos J. Lavernia', with a stylized flourish at the end.

Carlos J. Lavernia, M.D.